

VIVERDA[®] – võidat alati!





on uus õlildispersioon (OD) baasil laia tõrjespektri-
ga kaitsev ja raviv fungitsiid teraviljahaiguste tõr-
jeks. Kolm toimeainet ja preparaadi uudne vorm
tagavad kaitse põhiliste teraviljahaiguste vastu.

Toimeained

Boskaliid on karboksamiidide gruppi kuuluv süsteemse ja translaminaarse mõjuga toimeaine, mis on väga efektiivne helelaiksuse, DTR e. nisu-pruunlaiksuse, rooste, silmlaiksuse, odra-triipõve, äärislaiksuse, ramularia ja füsioloogilise laiksuse tõrjel.


Püraklostrobiin on stobiluriinide gruppi kuuluv kaitsva ja raviva toimega toimeaine, mis omab nii lokaalselt süsteemset kui ka translaminaarset mõju.

Tõrjub väga hästi roostehaigusi, lehtedel esinevat helelaiksust, odra-triipõve, äärislaiksust, ramulariat ja füsioloogilist laiksust. Püraklostrobiin omab ka füsioloogilist rohendavat efekti, mistõttu töödeldud lehed püsivad kauem rohelised.

Epoksikonasool on triasoolide gruppi kuuluv toimeaine, millel on väga tugev raviv mõju selliste teraviljahaiguste puhul nagu helelaiksused, roosted, DTR e. nisu-pruunlaiksus, äärislaiksus, osaliselt ka silmlaiksus.

Uuringute tagajärjed:

Talinisu saak t/ha



Helelaiksus lehtedel
(*Septoria tritici*)



Helelaiksus lehtedel
ja pähikul
(*Phaeosphaeria
nodorum*)



DTR e. nisu-
pruunlaiksus
(*Drechslera
tritici-repentis*)

Viverda® OD – see on:


- kolm toimeainet erineva toimemehhanismiga
- täisnormis mitte üks, vaid 2,6 fungitsiidi!
- väga lai toimespekter
- boskaliid, mis tõstab epoksikonasooli toimet helelaiksuste, silmlaiksuse, võrklaiksuse, ramularia ja füsioloogilise laiksuse tõrjel
- püraklostrobiin, mis tugevdab mõju DTR e. nisu-pruunlaiksuse vastu
- boskaliidi tugevdab mõju kõrtele, muutes nad lamandumiskindlamaks
- püraklostrobiini füsioloogiline rohendav efekt
- uudne OD formulatsioon

Viverda® OD formulatsioon tagab:

- väga hea lehtede kattuvuse
- ühtlase jaotumise taimes
- väga hea vihmakindluse
- parema kaitse uute nakkuste eest
- väga hea omastatavuse taimede poolt
- veelgi tugevama ja pikema raviva toime



Suviroda saak t/ha






Kollane rooste
(*Puccinia striiformis*)



Pruun e. leherooste
(*Puccinia recondita*)



Silmlaiksus
(*Oculimacula spp.*)




Vörklaiksus
(*Pyrenophora teres*)



Äärislaiksus
(*Rhynchosporium secalis*)



Odra-leherooste
(*Puccinia hordei*)



Ramularia
(*Ramularia collo-cygni*)

Suurem saak Parem kvaliteet

Kaitse
haiguste
vastu

Füsioloogiline
rohendav efekt

Vastupidavus
stressile

AgCelence
Oota enamat.

Unikaalne püraklostrobiini ja boskaliidi täiendav füsioloogiline toime taimedele kannab nüüdsest nime AgCelence. See on enam kui lihtsalt kaitse haiguste vastu.


Viverda etiketil on unikaalne lause: „Mõningatel juhtudel võib püraklostrobiini kasutamine anda positiivse mõju teravilja saagile ning kvaliteedile ka visuaalsete haigusnähtude puudumisel.“

Kasutusjuhised nisule

Kulunorm: 1,25 – 2,5 l/ha

Nisus soovitate **Viverda**® kasutada teiseks pritsimiseks lipulehe keelekesse ilmumisest kuni pea loomise lõpuni (BBCH 39–59).

Esimeks pritsimiseks soovitate kasutada fungitsiide – Allegro®Super, Capalo® või Tango®Super.



*Jahukaste korral lisa Corbel 0,2-0,3 l/ha või Flexity 0,1-0,25 l/ha

Viverda® mõju haigustele:

Nisu

Helelaiksus lehtedel	• • • •
Helelaiksus pähikul	• • • •
DTR e. nisu-pruunlaiksus	• • •
Kollane rooste	• • • •
Pruun e. leherooste	• • • •
Silmlaiksus (BBCH 30-32)	• • •
Kõrreliste jahukaste	• (•)

Oder


Vörklaiksus	• • • •
Äärislaiksus	• • • •
Odra-leherooste	• • • •
Ramularia	• • •
Füsioloogiline laiksus	• • •
Kõrreliste jahukaste	• •

Kasutusjuhised odrale

Kulunorm: 1,25 – 2,5 l/ha

Soovitame kasutada esimeste haigustunnuste ilmnemisel või profülaktiliselt.

Haigustundlike odrasortide puhul või muidu haiguste levikuks soodsatel tingimustel, võib tekkida vajadus korduvaks haiguste tõrjeks.



Viverda • Registreerimisnumber: 0425/07.12.11

Toimeained:	50 g/l epoksikonasool 140g/l boskaliid 60 g/l püraklostrobiin
Preparaadi vorm:	õlispersioon
Toime:	kaitsev ja raviv
Registreeritud:	tali- ja suvinisu, tali- ja suvioder, talirukis, tritikale
Soovituslik kulunorm:	1,25 – 2,5 l/ha
Töötlemiste arv:	kaks korda hooaja jooksul
Vihmakindlus:	1 tund
Ooteaeg:	35 päeva

Enne kasutamist lugeda tähelepanelikult läbi etikett

