

Efilor®

EE

Taimetaitsevahend
FUNGITSIID

Kaitsev sūsteemse toimega fungitsiid seenhaiguste tōrjeks tali- ja suvirapsil.

LV

Fungicīds
Aizsargājošs sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras rapša sējumos.

5 L e

 **BASF**
We create chemistry

® = registreeritud kaubamārk BASF / BASF reģistrēta tirdzniecības zīme

81104680LV1016-Latvia





Toote kirjeldus

Efilor on uuenduslik fungitsiid, mis sisaldab toimeaineid boskaliid ja metkonasool, mõlemad toimeained on sarnaselt teraviljadele mõeldud ka rapsil kasutamiseks.

Boskaliid on süsteemse ja translaminaarse toimega, mis pärast lehekudedesse tungimist kandub taime sees akropetaalselt (ladva suunas). Optimaalne kasutamise aeg on ennetav pritsimine peamiste rapsi seenhaiguste tõrjeks nagu valgemädanik (*Sclerotinia sclerotiorum*), ristõieliste mustmädanik (fomoos) (*Leptosphaeria maculans*, anamorf *Phoma lingam*) ja ristõieliste kuivlaikus (*Alternaria brassicae*).

Metkonasool on laia tõrjespektriga raviva ja kaitsva toimega fungitsiid paljudele rapsi haigustele: ristõieliste kuivlaikus (*Alternaria brassicae*), valgemädanik (*Sclerotinia sclerotiorum*), ristõieliste ebajahukaste (*Peronospora brassicae*), ristõieliste mustmädanik (fomoos) (*Phoma lingam*) ja hahkhallitus (*Botrytis cinerea*). Metkonasool on lokaalselt süsteemse mõjuga ja akropetaalselt liikuv.

Resistentsuse oht

Rapsihaiguste resistentsuse ohu hindamine näitab madalat või keskmist resistentsuse tekkimise riski. Efilor'i tuleb kasutada ennetaval viisil, järgides juhiseid etiketil ja terviklikku pritsimisprogrammi peavad kuuluma erineva toimeainega fungitsiideid.

Efilor sisaldab SDHI (karboksamiid) fungitsiidide gruppi kuuluvat boskaliidi ja DMI fungitsiidide gruppi kuuluvat metkonasooli. Puuduvad tõendid *Sclerotinia sclerotiorum*, *Alternaria brassicae* ja *Phoma lingam* SDHI või DMI grupi rapsifungitsiidide suhtes resistentsete tüvede esinemiste kohta põllutingimustes. Praegu on tõendatud ristresistentsuse esinemine boskaliidi ja teiste SDHI grupi fungitsiidide vahel, kuid senini ei ole täheldatud boskaliidi ristresistentsuste teist toimeviisi

Tähelepanuks!

Fungitsiidide kasutamisel võivad tekkida või juba olemas olla resistentsed seenhaiguste tüved. Resistentsete haigustekitajate väljakujunemist on väga raske eelnevalt kindlaks määrata, kuna see sõltub paljude bioloogiliste ja agronoomiliste tegurite koosmõjust. Seda arvesse võttes ei vastuta tootja ega edasimüüjad kahjude eest, mille on põhjustanud fungitsiidi ebapiisav toime resistentsetele haigustekitajatele. Vähendamaks resistentsuse riski soovib BASF alati kinni pidada etiketil antud soovitustest.

KASUTUSJUHEND

Kultuurid ja haigused

Efilor'i kasutatakse tali- ja suvirapsil järgmiste haiguste tõrjeks:

Kuivlaikus	<i>Alternaria</i> spp.
Ebajahukaste	<i>Peronospora brassicae</i>
Ristõieliste Mustmädanik (fomoos)	<i>Leptosphaeria maculans</i> (anamorf <i>Phoma lingam</i>)
Valgemädanik	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>
Hahkhallitus	<i>Botrytis cinerea</i>



Töötlemise aeg ja kulunorm

Efilor'i kasutatakse eelkõige kaitsva pritsimisena enne haigustekitaja sümptomite ilmumist.

0,7 – 1,0 l/ha tali- ja suvirapsil kasvufaasis 13-75 (3 lehe faasist kuni pooled peavarre kõtradest on normaalsuurusega, seemned on rohelised ja piimjad).

Rapsi hilises faasis esinevate haiguste tõrjeks tuleb pritsimine teha kõrge riski esinemisel rapsi varase kuni täieliku õitsemise ajal (kasvufaasis 63-65) kas vahetult enne või esimeste kroonlehtede varisemise faasis, kui haigustunnused on nähtavad.

Pritsida hommiku- või õhtutundidel kui mesilased ja teised kasulikud putukad ei lendle!

Maksimaalne töötlemiste arv: 1

Ooteaeg: 42 päeva

Vee kogus: 200 – 400 l/ha. Taimede õite, lehestiku ja varte ühtlaseks katmiseks pritsimislahusega tuleb valida taimiku tihedusele vastav vee kogus.

Vähendatud vee kogused

Efilor'i võib kasutada 0,7 – 1,0 l/ha ka vee hulgaga 100 l/ha, kuigi tõrje efektiivsust sellise vähendatud kogusega ei ole põhjalikult uuritud. Šeetõttu on pritsimine vee kogusega 100 l/ha sutaja enda vastutusel.

Pritsimislahuse valmistamine

Täida pool pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Lisa vajalik kogus Efilor'i ja ülejäänud vee kogus, jätkates pidevalt segamist. Segisti jätta tööle nii transportimisel kui pritsimisel. Ära kunagi valmista pritsimislahust rohkem kui pritsimiseks vaja. Efilor on vihmakindel 1 tunni möödumisel pritsimisest.

Segatavus teiste preparaatidega

Efilor'i võib segada rapsi fungitsiidiga Juventus® 90, insektsiidiga Fastac® 50, herbitsiididega Butisan® 400, Butisan® Star, Butisan® Kombi, Butisan® Avant ja mitmete vedelväetisega (näit. Tradebor, Nutribor[®] SP). Kokku segamisel kasutada segistit, vahu tekkimisel kasutada vahuvastast ainet.

Tähelepanuks!

Kaitsmaks tolmendavaid mesilasi ära kasuta segus Fastac 50'ga rapsi/umbrohtude õitsemise ajal.

Pritsi puhastamine

Pese pritsi hoolikalt puhta veega kohe pärast kasutamist ja järgi seadme tootja poolseid juhiseid.



Jäätmete ja taara kahjutustamine

Kasutatud taarat ei tohi uuesti kasutada. Pärast tühjendamist loputada taarat kasutades integreeritud surveloputuse seadet või loputada käsitsi vähemalt kolm korda puhta veega. Loputusvesi valada valmistatava töölahuse hulka. Preparaadi ülejäägid ja tühjendatud pakendid viia ohtlike jäätmete kogumiskohta

Säilitamine

Kaitsta järgnevatel temperatuuridel: alla 0 °C ja üle 40 °C. Kui ainet/toodet säilitada pikka aega ettenähtud temperatuurist kõrgemal, võivad muutuda toote omadused. Hoidke eraldi toiduainetest ja loomasöödadest. Kaitske niiskuse eest. Hoida eemal soojusallikast. Kaitske otsese päikesevalguse eest.

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse: Sobiv hingamiselundite kaitsevahend kõrgemate kontsentratsioonide või pikaajalise mõju vastu: Kombineeritud filter gaaside/orgaaniliste, anorgaaniliste, happeanorgaaniliste ja leelisühendite aurude püüdmiseks (nt. EN 14387 Tüüp ABEK).

Kätekaits: Sobivad kemikaalikiindlad kaitsekindad (EN 374) ka pikaajalise otsese kokkupuute puhuks (Soovitav: kaitseindeks 6, mis EN 374 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit): näiteks nitrilikummi (0.4 mm), kloropreenikummi (0.5 mm), butüülikummi (0.7 mm) ja muud.

Silmakaits: Ohutusprillid, mille küljed on suletud (kaitseprillid) (nt. EN 166).

Kehakaits: Kehakaitsese vahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, nt. põll, kaitsekaapad, keemiakaitsese ülikond (vastavalt EN 14605 pritsmete korral või EN ISO 13982 tolm korral).

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed

Kasutusjuhendi väited isiklike kaitsevahendite kasutamise kohta kehtivad taimekaitsevahendite käsitsemisel lõppkasutaja pakendis. Soovitav on kanda kinniseid tööriivaid.

Säilitage tööriivaid eraldi. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödad

Esmaabimeetmed:

Esmaabimeetmete kirjeldus: Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese ohutusele. Kui patsient võib teadvuse kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses küllili asendis (taastumisasendis). Eemaldage saastunud riivad koheselt.

Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst.

Kokkupuutel nahaga: Peske koheselt põhjalikult seebi ja veega, pöörduge arsti poole.

Kokkupuutel silmadega: Kannatada saanud silmi pesta avatud laugudega vähemalt 15 minutit voolava vee all ja pöörduka seejärel silmaarsti poole.

Allaneelamisel: Loputage kohe suud ning jooge 200-300 ml vett, pöörduge arsti poole. Ärge kutsuge esile oksendamist hingamisohu tõttu.

Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Käitlemine: Kohelge vastavalt sümptomitele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.



Tootja vastutus

Kasutusjuhend ning pritsimise soovitusel on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha. Kuna kasutustingimused jäävad väljaspoole tootja kontrolli, ei vastuta tootja ebapiisava mõju või mistahes kahjustuse eest sellistes tingimustes. Tootja ei vastuta ka ettenägematute tingimuste tagajärjel tekkinud kahjude eest.

® = BASF registreeritud kaubamärk

Pirmā palīdzība:

- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās, turot atvērtas, nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izskalojot muti, izdzer 100 ml ūdens un nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Informācija ārstam: Simptomātiskā ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs 67042473.

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, P2 tipa respirators ar daļiņu filtru EN 143, ķīmiski necaurļaidīgi cimdi un slēgti apavi. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, apģērba vai acīs.

Iepakojuma likvidēšana

Tukšo taru izliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoši izskalo ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Efilor®**Fungicīds****Aizsargājošs sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras rapša sējumos.**

Darbīgās vielas: boskalīds 133 g/l, metkonazols 60 g/l

Suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas Nr. 0372

Reģistrācijas klase: 2.

Preparāta apraksts

Efilor ir jauna fungicīda formulācija lietošanai rapšu sējumos, kas satur divas darbīgās vielas – boskalīdu un metkonazolu.

Boskalīdam piemīt sistēmiska un translamināra iedarbība, pēc iekļūšanas augā caur lapu virsmu darbīgā viela pārvietojas akropetāli (virzienā uz augšu). Optimāls laiks nozīmīgāko rapša slimību: baltās puves (Sclerotinia sclerotiorum), krustziežu stublāju puves (Leptosphaeria maculans) un krustziežu sausplankumainības (Alternaria brassicae) ierobežošanai ir aizsargājoša (profilaktiska) apstrāde.

Metkonazolam ir plaša spektra fungicīds ar ārstējošu un aizsargājošu iedarbību uz virkni rapšu slimību ierosinātāju - Alternaria brassicae, Sclerotinia sclerotiorum, Peronospora brassicae,

Phoma lingam un Botrytis cinerea. Metkonazolam ir lokāli sistēmiska iedarbība un tas pārvietojas augos virzienā uz augšu.

Rezistences riska ierobežošanas stratēģija

Galveno ražu slimību izplatības riska izvērtējums norāda uz zemu vai vidēju rezistences veidošanās risku. Efilor ir lietojams profilaktiski, saskaņā ar marķējumā minētajām lietošanas rekomendācijām, un kā neatņemama smidzināšanas programmas daļa, kurā iekļauti fungicīdi no dažādām darbīgo vielu grupām.

Efilor satur boskalīdu, kurš pieder SDHI (karboksamīdi) fungicīdu grupai, un metkonazolu, kas pieder DMI (demetilācijas inhibitori) grupai. Nav liecību par tīrumos konstatētiem Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria brassicae vai Phoma lingam sēnīšu celmiem, kas ir rezistenti pret SDHI vai DMI grupas fungicīdiem ražu sējumos. Šobrīd ir pierādījumi par krustenisko rezistenci starp boskalīdu un citiem SDHI grupas fungicīdiem, bet krusteniskā rezistence nav novērota ar fungicīdiem no citām darbīgo vielu grupām. Krusteniskā rezistence nepastāv vai nav korelācijas jutībā starp triazoliem un vielām ar citiem iedarbības mehānismiem.

Vairākiem fungicīdiem pastāv rezistences izveidošanās iespēja slimības ierosinātājiem. Šī iemesla dēļ nevar izslēgt efektivitātes izmaiņas. Rezistences veidošanos var veicināt dažādi kultūraugu audzēšanas un preparātu pielietošanas faktori, kurus nav iespējams paredzēt. Tādēļ ražotājs nevar uzņemties atbildību par šādu iespējamo izmaiņu sekām. Lai izvairītos no efektivitātes samazināšanās ir noteikti jāievēro BASF ieteiktās preparāta devas un lietošanas rekomendācijas.

Lietošana

Efilor® lieto ziemas un vasaras rapša sējumos sekojošu slimību ierobežošanai:

krustziežu sausplankumainība

(Alternaria brassicae),

krustziežu stublāju puve

(Leptosphaeria maculans, syn. Phoma lingam),

baltā puve

(Sclerotinia sclerotiorum).

Lietošanas laiks

Smidzināšana pret balto puvi (Sclerotinia sclerotiorum) veicama profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos no agras ziedēšanas stadijas līdz rapša ziedēšanas fāzes vidum, kad sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 63-65). Pret krustziežu sausplankumainību un krustziežu stublāju puvi Efilor, smidzināt profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm no 7 lapu stadijas līdz pilnas ziedēšanas stadijai, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 17-65).

Deva: 0,7 – 1,0 l/ha.

Smidzinot pret krustziežu stublāju puvi (Phoma lingam) lietot devu 1,0 l/ha.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize

Bezlietus periods

1 stunda.

Nogaidīšanas laiks: 42 dienas

Ūdens patēriņš 200 – 400 l/ha. Sabiezinātos sējumos lietot atbilstošu darba šķidrums daudzumu uz hektāru, lai nodrošinātu pilnīgāku ziedu, lapu vai stublāju noklāšanu ar fungicīdu.

Piezīme:

Efilor ar devu 0,7 – 1,0 l/ha var lietot, samazinot darba šķidrums daudzumu līdz 100 l/ha, taču šī apjoma efektivitāte nav vērtēta. Tādēļ 100 l/ha darba šķidrums izmantošanas bioloģiskā efektivitāte ir paša lietotāja atbildība.

Darba šķidrums sagatavošana

Piepildiet ½ smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Pievienojiet nepieciešamo Efilor® daudzumu un piepildiet atlikušo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīt šķidrumu transporta un darba laikā. Nekad nesajauciet vairāk darba šķidrums nekā nepieciešams.

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)

Efilo® var jaukt tvertnes maisījumos ar insekticīdu Fastac® 50, kā arī lapu mēslojumu, piemēram, Nutribor^{az} SP, ja saskan preparātu lietošanas termiņi. Ja maisīšanas laikā tvertne veidojas putas, izmantot pretputošanas vielas.

Uzmanību!

Lai aizsargātu bites, nelietot tvertnes maisījumu ar Fastac® 50 rapša vai tīrumā esošo nezāļu ziedēšanas stadijā.

Vides aizsardzības prasības

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot "Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā" ietvertu likumu prasības un rekomendācijas. Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšana

Glabāt sausā, aizslēdzamā, no siltuma un tiešas saules gaismas pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C.

Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Juridiskā atbildība

Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantē tā sastāvdaļu savstarpējo atbilstību un preparāta kvalitāti. Ražotāja instrukcijas un ieteikumi ir pārbaudīti praksē daudzu gadu laikā. Preparāta iedarbību var ietekmēt dažādi faktori, kas raksturīgi katrai vietai vai reģionam, piemēram, laika apstākļi, augsnes īpašības, kultūraugu veidi, augu sēka, lietošanas termiņi, preparāta devas, maisījumi ar citiem preparātiem, rezistentu organismu parādīšanās, smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti nelabvēlīgu apstākļu ietekmē ir iespējamas izmaiņas preparāta iedarbībā, vai arī kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām sekām, kā arī par zaudējumiem, kas var rasties ražotāja ieteikto instrukciju patvaļīgas neievērošanas un ignorēšanas rezultātā preparāta ražotāji un izplatītāji nevar uzņemt atbildību.

® = reģistrēta BASF tirdzniecības zīme, Vācija

® = reģistrēta COMPO GmbH&Co tirdzniecības zīme

Efilor®

EE

Taimekaitsevahend FUNGITSIID

Toimeaine: boskaliid 133 g/l, metkonasool 60 g/l

Keemiline rühm: karboksamiidid, asoolid

Preparaadi vorm: Suspensiooni kontsentraat (SC)
Sisaldab ohtlikke aineid boskaliid ja metkonasool.

Kaitsev süsteemse toimega fungitsiid seenhaiguste tõrjeks tali- ja suvirapsil.

Efilor'i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiaatus

H361d Arvatavasti kahjustab loodet.

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH208 Sisaldab 1,2-bensotiasool-3-one. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohutamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega

P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski.

P308 + P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörda arsti poole.

P501 Viige sisse/mahuti ohtlike või erijäätmete kogumispunkti SP 1 Väldida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/ Väldida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT TOOTE ETIKETTI

Informatsioon avarii korral, tootja/firma telefon: +49 180 2273112
Hädaabi telefon: 112

Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast alates

Säilitamine: Hoida temperatuuril 0 °C kuni + 40 °C.

Tootja/pakkija: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Saksamaa
Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, postkast 14, Laagri, Saue vald 76491 Harjumaa Tel. (0) 530 30755

Eesti reg. nr.: 0424/07.12.11

Loa valdaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Taani

5 L e



® = registreeritud kaubamärk BASF / BASF registreeritud tirdzniecības zīme



LV

Fungicīds

Aizsargājošs sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras rāpša sējumos.

Darbīgās vielas: boskaliids 133 g/l, metkonasool 60 g/l
Suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas Nr. 0372

Reģistrācijas klase: 2.

Uzmanību

H361d I ar zaidomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH208 Satur 1,2-benzotiazoliol-3-one. Var izraisīt alerģisku reakciju.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P281 Izmantoj personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām.

P201 Pirms lietošanas saņem speciālu instrukciju.

P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet medicīnu palīdzību.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas cauru drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPE 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Emergency information telefon: +49 180 2273 112
Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrūnis: 112

Uzglabāšana

Glabāt no mitruma un sala pasargātā aizsildzamā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C. Iepakojumu turēt cieši noslēgtu.

Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Ražotājs: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vācija

Reģistrētājs: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Dānija

Pārstāvēniecība: BASF Agro, Mārupe, Lambertu iela 33B, tālr. 67 508 250

Partij nr./ Valmistamise kuupāev: vaata pakindpi
Partijas Nr. un izgatavošanas datum skatit uz aizsargiepakojuma

81101949LV1105-Latvia