

Focus® Ultra

(EST)

Taimekaitsevahend

Herbitsiid

Süsteemne herbitsiid ühe- ja mitmeaastaste kõrreliste umbrohtude tõrjeks järgmistel kultuuridel: uba, hernes (toiduks ja söödaks), lutsern seemneks, suhkrupeet, söödapeet ja söögipeet, kapsad (spargelkapsas, rooskapsas, lillkapsas, peakapsas, lehtkapsas, savoia kapsas), porgand, ristik seemneks, maasikas, punane aruhein seemneks; lina, mais (ainult tsükloksüdiimile vastupidavad maisisordid), tali- ja suviraps, rüps, naeris, kaalikas, sibulad, porru, kartul, seemneviljalised viljapuud

(LV)

Herbicīds

Herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša, cukurbiešu, lopbarības biešu, kartupeļu, kāpostu, zemeņu, linu, zirņu un burkānu sējumos un stādījumos.

Emulsijas koncentrāts

5 Le

 **BASF**
We create chemistry

® = registreeritud kaubamärk BASF / BASF SE registreeritud tirdzniecības zīme

81109824LV1068



ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT TOOTE ETIKETTI

Keskonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja aparatuuri pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Toimemehhanism

Focus Ultra on selektiivse toimega umbrohutõrjevahend, millel on mõju nii ühe- kui mitmeaastastele kõrreliste umbrohtudele, välja arvatud murunurmikas. Tõrjevahendi toimeaine tungib taimedesse roheliste lehtede kaudu. Herbitsiidi kasutamise järel peatub umbrohu kasv. Nädala möödudes muutub taim punakaks ning ülemine võrse on kergesti murduv. Taim närtsib 3-5 nädala pärast.

Head kasvutingimused, eriti sobiv mullaniiskus, soodustavad preparaadi mõju.

Päikesepaisteline ja kuiv ilm vähendavad preparaadi mõju, mistõttu on soovitatav pritsida õhtupoolikul ning kasutada suuremat kulunormi. Vihm tund pärast pritsimist ei vähenda tõrjeefektiivsust. Olenevalt kultuurist on orasheina tõrje Focus Ultra'ga erinev. Tihedalt kasvava kultuuri puhul, näiteks raps, on preparaadi mõju tugevam. Peedi puhul aga, kus orasheinale on rohkem kasvuruumi, peaks kasutama suuremat kulunormi.

Orasheina tõrjel Focus Ultra'ga võib esineda vegetatsiooniperioodi lõpus mõningast võrsete juurdekasvu.

Tsükloksüdiimi taluvad suurepäraselt kaheidulehelised kultuurid, kõik liilialiste sugukonna perekonnad (Allium, Tulipa ja teised) ja okaspuu kultuurid.

Tänu väga heale selektiivsusele ei tõrju Focus Ultra kaheidulehelisi umbrohtusid ning mõnesid üheidulehelisi kultuure/umbrohtusid: lõikheinalisi (Cyperaceae), punane aruhein (*Festuca rubra*) ja omab väga nõrka mõju murunurmikale (*Poa annua*).

Tõrjutavad umbrohud

Mitmeaastased kõrrelised: harilik orashein (*Elytrigia/Agropyron repens*), üheaastased kõrrelised: harilik rukki-kastehein (*Apera spica-venti*), tuulekaer (*Avena fatua*), viljatu luste (*Bromus sterilis*), tähkjas kukehirss (*Echinicloa crus-galli*), raihein (*Lolium multiflorum*), aasnurmikas (*Poa pratensis*) ja teised, ka ise kasvama hakanud teraviljad tali- ja suvinisu, oder, kaer, rukis, tritikale.

Kasutamisy juhend

Kultuurid, pritsimisfaas:

Oad, herned (söögiks ja söödaks) – BBCH 12-39, kaks lehepaari kuni vars normaalkõrguses;

Peedid – BBCH 12-39, kaks lehte kuni lehestiku kasvu ja juurika arengu lõpp: suhkrupeet, söödapeet ja punapeet;

Peakapsas – BBCH 12-45, teisest lehest kuni 50% eeldatavast pea suuruselt on saavutatud;

Kapsad – BBCH 13-35, kolm pärislehte kuni üheksa ja rohkem lehte või pead mitte moodustavatel kapsastel kuni 50% leherosetist on moodustunud: brokkoli, spargelkapsas, rooskapsas, lillkapsas, lehtkapsas, hiinakapsas;

Savoiia kapsas – BBCH 15-45, 3 pärislehte kuni 50% lehemassist on moodustunud;

Porgand – BBCH 12-45, kaks pärislehte kuni 50% juurika suuruselt saavutatud;

Ristik seemneks – BBCH 12-55, teine leht kuni tupplehed veel suletud;

Maasikas – BBCH 11-16, esimene leht kuni 5 ja enam lehte avanenud;

Punane aruhein seemneks (*Festuca rubra*, *Festuca brevipila*) – BBCH 14-34, võrsumine

kuni kõrsumise keskpaik;

Lina seemneks, õliks ja kiuks – BBCH 12-39, teise lehmaari lehed ca 1 cm pikkused kuni varsumise lõpp;

Lutsern seemneks – BBCH 11-51, esimene pärisleht avanenud kuni õiepungade moodustumise algus;

Mais (ainult tsüklöksüdiimile vastupidavad maisisordid) – BBCH 12-19, kaks lehte kuni üheksa ja rohkem lehte;

Tali- ja suviraps – BBCH 12-32, teine leht kuni varsumise algus;

Rüps, kaalikas – BBCH 13-39, kolmas leht kuni lehestiku kasvu ja juurika arengu lõpp;

Sibulad – BBCH 15-45, lehtede moodustumise lõpp kuni 50% mugula suuruselt on saavutatud;

Porru – BBCH 12-45, tärkamine kuni saagiks kasutatavad vegetatiivorganid on 50% saavutatud;

Kartul – BBCH 10-39, tärkamine kuni võrsumise lõpp;

Seemneviljalised viljapuud – kuni BBCH 76, viljad 50% loomulikust suuruselt.

Kulunorm:

Focus Ultra 4,0-5,0 l/ha – mitmeaastaste kõrreliste tõrjumiseks varases kasvufaasis, tärkamisel esimene leht on lahti rullunud kuni võrsumise lõpuni (BBCH 11-29)

Focus Ultra 1,0-2,0 l/ha – üheaastaste kõrreliste ja ise kasvama hakanud teraviljade tõrjumiseks varases kasvufaasis, tärkamisel esimene leht on lahti rullunud kuni 1. kõrresõlme moodustumiseks (BBCH 11-31).

Madalatele kulunormidele lisada kleepainet DASH 0,5 – 1,0 l/ha, kulunormi DASH 2,0 l/ha ei tohi ületada.

Maksimaalne pritsimiskordade arv – 1

Ooteaeg:

Uba (kuiv, kaunadeta) 56 päeva; uba (roheline kaunadeta ja kauntega) 28 päeva

Spargelkapsas 28 päeva

Rooskapsas 56 päeva

Porgand 35 päeva

Lillkapsas 28 päeva

Mais (tsüklöksüdiimikindel sort) 28 päeva

Lehtkapsas 42 päeva

Porru 42 päeva

Savioia kapsas 21 päeva

Sibul 28 päeva

Hernes (kuiv ilma kaunadeta) 56 päeva

Hernes (roheline kaunadega ja ilma) 35 päeva

Seemneviljalised viljapuud 28 päeva

Kartul 56 päeva

Maasikas 42 päeva

Valge peakapsas 28 päeva

**Vee kogus:**

Soovitatud vee kogus: 100-400 l/ha.

Segatavus:

Focus Ultra't võib segada enamike teravilja herbitsiidide, insektsiidide ja kasvuregulaatoritega. Segudes on lubatud kasutada vaid Eesti Vabariigis turule lubatud taimekaitsevahendeid, näiteks: Butisan 400, Butisan Star, Butisan Kombi, Butisan Avant, Basagran 480, Arrat, Banvel 4S, Juventus 90, Folicur, Signum, Betanal Expert, Caryx, Duett Ultra ja teised fungitsiidid, Fastac 50, Karate Zeon.

Iga toode tuleb lisada pritsipaaki eraldi ja peab olema täielikult lahustunud enne järgmise toote lisamist. Enne toodete segamist loe hoollega iga preparaadi etiketti.

Kasutamise piirang:

Kartulit ei tohi mullata enne ega pärast Focus Ultra'ga pritsimist.

Ettevaatusabinõud:

Pritsimisel hoiduda ülekandumisest e. triivist väljaspool pritsimisala kasvavatele kõrreliste (Poaceae) taimedele.

Pritsimistehnoloogia:

Enne pritsi paagi täitmist veega tuleb kontrollida, et paagis ei oleks varem kasutatud preparaate jääke ja prits oleks korralikult pestud selleks sobiva pesuvahendiga. Samuti tuleb puhastada ka filtrid ja pihustid. Teatud herbitsiidide jäägid võivad Focus Ultra'ga reageerides moodustada ühendeid mis kahjustavad kultuuri. Eriti hoolsalt tuleb pritsi puhastada kui eelnevalt on kasutatud grammherbitsiide, kindlasti on vaja kasutada spetsiaalset pesuvahendit.

Valmis pritsimisvedelik tuleb ära kasutada samal päeval.

Pritsimislahuse valmistamine:

Täida prits 3/4 ulatuses veega ja pane segisti tööle. Enne avamist loksuta preparaadi mahutit korralikult, et toode segunek. Lisa vajalik kogus Focus Ultra't pritsipaaki jätkates pidevalt segamist. Lisa ülejäänud vajaminev vee kogus ja jätka pidevalt segamist pritsimislahuse valmistamiseni. Pritsimislahus tuleb kasutada kohe pärast valmistamist.

Jääkide ja taara kahjutustamine:

Pakendi korduvkasutamine on keelatud. Pärast tühjendamist pesta pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Pesuvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Hoiutingimused:

Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla 0 °C ja üle +30 °C. Tagatud säilimisaja kinnises originaalpakendis vähemalt 2 aastat.



Pritsi puhastamine:

Pese prits hoolikalt puhta veega kohe pärast kasutamist, järgides seadme tootja ja hea katse tava juhiseid.

Kõrrelised nagu raihein võivad olla tundlikud isegi väikestele Focus Ultra kogustele. Veendu, et kõik toote jäägid on pritsipaagist eemaldatud enne pritsi kasutamist nendel kultuuridel.

Resistentsuse oht:

Euroopas on aeg-ajalt esinenud herbitsiidi resistentsust toodetele, mis sisaldavad Focus Ultra'ga samu toimeaineid, eriti ACC-inhibiitoreid (HRAC-klass A). Herbitsiidide korduval kasutamisel samal kasvuperioodil või mitmel aastal samal põllul tuleb arvestada erinevate toimeainetega toodete kasutamisega. Vastasel juhul toimub resistentsete biotüüpide valik, mis võivad paljuneda ja domineerima hakata.

Niipalju kui võimalik suurenda kultuuri tõrje meetmeid (nt külvikord, kündmine jne.). Kasuta paagisegusid või erineva toimega efektiivseid herbitsiide üksikutel kultuuridel või järgnevatel kultuuridel.

Jälgi põldu regulaarselt ja selgita iga halva tõrje põhjused.

Isikukaitsevahendid:

Hingamisteede kaitse: Sobiv hingamiselundite kaitsevahend kõrgemate kontsentratsioonide või pikaajalise mõju vastu: Kombineeritud filter gaaside/orgaaniliste, anorgaaniliste, happeanorgaaniliste ja leelisühendite aurude püüdmiseks (nt. EN 14387 Tüüp ABEK).

Kätekaitse: Sobivad kemikaalikindlad kaitsekindad (EN 374) ka pikaajalise otsese kokkupuute puhuks (Soovitav: kaitseindeks 6, mis EN 374 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit): näiteks nitriliummi (0.4 mm), kloropreenkummi (0.5 mm), butüülkummi (0.7 mm) ja muud.

Silmakaitse: Ohutusprillid, mille küljed on suletud (kaitseprillid) (nt. EN 166)

Kehakaitse: Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, nt. põll, kaitseasapad, keemiakaitse-ülikond (vastavalt EN 14605 pritsmete korral või EN ISO 13982 tolmu korral).

Esmaabi meetmed:

Üldised nõuanded: Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese ohutusele. Kui patsient võib teadvuse kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses külili asendis (taastumisasend). Võtta koheselt seljast saastunud rietus.

Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst.

Kokkupuutel nahaga: Nahale sattumisel peske koheselt rohke vee ja seebiga. Kui tekib ärritus, pöörduge arsti poole.

Kokkupuutel silmadega: Peske mõjutatud silma koheselt vähemalt 15 minutit voolava vee all hoides silmalaugu lahti, konsulteerige silmaarstiga.

Allaneelamisel: Loputage koheselt suud ning jooge seejärel 200-300 ml vett, pöörduge arsti poole. Ärge kunagi kutsuge esile oksendamist hingamisohu tõttu.

Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju:

Sümptomid: kõige olulisemaid tuntud sümptomeid ja mõjusid kirjeldatakse toote



ohutuskaardil.

Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta:
Sümptomitele vastav kohtlemine (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid).

Mürgisusalane informatsioon mürgistusteabekeskuse telefonil: 16662
Häirekeskuse number: 112

Kasutaja risk:

Taimekaitsevahend valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisujuhend ning soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede resistentse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.

® = BASF registreeritud kaubamärk

Pirmā palīdzība:

- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Rodoties kairinājumam, meklēt medicīnisku palīdzību.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās, turot atvērtas, nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Konsultēties ar acu ārstu.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, nekavējoties izskalot muti un izdzert 100 ml ūdens. Nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Informācija ārstam: Simptomātiskā ārstēšana, specifisks antidots nav zināms. **Saundēšanās informācijas centra tālrunis: 67 042 473**

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neest un nesmekēt, darbojoties ar vielu. Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, apģērba vai acīs. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, P2 tipa respirators ar daļiņu filtru EN 143, ķīmiski neaurlaidīgi cimdi (EN 374) un slēgti apavi. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

Iepakojuma likvidēšana

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoši izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Herbicīds

Herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša, cukurbiešu, lopbarības biešu, kartupeļu, kāpostu, zemeņu, līnu, zirņu un burkānu sējumos un stādījumos

Emulsijas koncentrāts

Darbīgā viela: cikloksidims 100 g/l

Reģistrācijas Nr. 0065 Reģistrācijas klase 2

Preparāta apraksts

Focus Ultra iedarbojas uz viendīgļlapju nezālēm caur lapām un tālāk izplatās uz augšanas punktu un sakņu sistēmu, izraisot nezāļu atmiršanu. Nezāļu augšana apstājas dažu dienu laikā, bet jūtīgām nezālēm dažu stundu laikā pēc smidzināšanas. Jaunie dzinumi kļūst brūngani dažu dienu laikā, bet pilnīga nezāļu atmiršana notiek 3 – 5 nedēļu laikā. Vislabāko efektivitāti nodrošina optimāli augšanas apstākļi – silts laiks un pietiekošs augsnes mitrums. Focus Ultra raksturīga ļoti augsta selektivitāte pret divdīgļlapju kultūrām.

Lietošanas norādījumi

Stabilas un ātras efektivitātes nodrošināšanai Focus Ultra vienmēr jālieto kopā ar virsmas aktīvo vielu Dash. Tas darbojas kā mitrinātājs, kas palielina herbicīda pielipšanas spēju pie lapu virsmas, tādējādi samazinot preparāta zudumus, kā arī veicina darbīgās vielas iekļūšanu augā, tādējādi nodrošinot augstāku efektivitāti. Mazākā Dash deva jālieto, ja ir optimāli apstākļi nezāļu ierobežošanai. Lielākā Dash deva nepieciešama gadījumos, ja piesārņojums ar nezālēm ir liels, vai arī tās pāraugušas optimālo ierobežošanas stadiju. Optimālais lietošanas laiks, ierobežojot ismūžu viendīgļlapju nezāles – rudzu smilgu (*Apera spica-venti*), vējauzu (*Avena fatua*), lapsastes (*Alopecurus myosuroides*), parasto skareni (*Poa annua*), lācauzu un izbīrušos graudaugus (*Volunteer cereals*), ir tad, kad nezāles sasniegušas 2 – 4 lapu stadiju. Optimālais lietošanas laiks, ierobežojot vārpatu (*Elymus repens*), ir tās 3 – 5 lapu stadijā (vārpatu apmēram 15 – 20 cm).

Ziemas un vasaras rapša sējumos:

Devas: 1.0 – 1.5 l/ha Focus Ultra + 0.5 – 1.0 l/ha Dash rudzu smilgas, lācauzas, vējauzas, labības sārņaugu u.c. ismūžu viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai (izņemot maura skareni). Lielākā deva nepieciešama lācauzas ierobežošanai.

Deva vārpatas ierobežošanai: 1.5 – 2.0 l/ha Focus Ultra + 0.5 – 1.0 l/ha Dash. Dalītās apstrādes gadījumā deva 1.0 – 1.5 l/ha Focus Ultra + 0.5 – 1.0 l/ha Dash, atkārtojot apstrādi ar tādu pašu devu pēc tam, kad vārpatā ataugusi.

Linu sējumos:

Deva vārpatas ierobežošanai: 1.5 – 2.0 l/ha Focus Ultra + 0.5 – 1.0 l/ha Dash. Dalītās apstrādes gadījumā deva 1.0 – 1.5 l/ha Focus Ultra + 0.5 – 1.0 l/ha Dash, atkārtojot apstrādi ar tādu pašu devu pēc tam, kad vārpatā ataugusi.

Deva linu aireses ierobežošanai: 1.0 – 1.5 Focus Ultra + 0.5 – 1.0 l/ha Dash.

Cukurbiešu, lopbarības biešu, kartupeļu, kāpostu, burkānu, zirņu platībās:

Deva vārpatas ierobežošanai: 1.5 – 2.0 l/ha Focus Ultra + 0.5 – 1.0 l/ha Dash. Dalītās apstrādes gadījumā deva 1.0 – 1.5 l/ha Focus Ultra + 0.5 – 1.0 l/ha Dash, atkārtojot apstrādi ar tādu pašu devu pēc tam, kad vārpatā ataugusi.

Zemeņu stādījumos:

Deva vārpatas ierobežošanai: 1.0 – 1.5 l/ha Focus Ultra + 0.5 – 1.0 l/ha Dash divas reizes veģetācijas periodā. Pirmo reizi pirms zemeņu ziedēšanas un atkārtoti pēc ražas novākšanas. **Nogaidīšanas laiks** zemeņu stādījumos: 40 dienas

Efektivitāte:

Ar devu 1.0 l/ha Focus Ultra + 0.5 l/ha Dash

pret vējauzu, lapsastēm, rudzu smilgu, parasto skareni, vasaras miežiem, auzām.

Ar devu 1.5 l/ha Focus Ultra + 0.5 l/ha Dash

pret ziemas kviešiem, ziemas miežiem, rudziem, lācauzām.

Ar devu 1.5 – 2.0 l/ha Focus Ultra + 0.5 – 1.0 l/ha Dash vai arī dalītā apstrādē 2x ar devu 1.0 – 1.5 l/ha Focus Ultra + 0.5 – 1.0 l/ha Dash pret ložņu vārpatu.



Bezlietus periods: 1 stunda.

Maksimālais apstrāžu skaits - 1 reize, zemenēm un dalītā apstrādē - 2 reizes.

Ūdens patēriņš 100 – 200 l/ha

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)

Nelietot maisījumu Focus Ultra + Dash ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem. Ja nepieciešams, rapša sējumā vienlaicīgi var veikt apstrādi ar Butisan Star (vai Butisan 400) un Focus Ultra, nepievienojot virsmas vielu Dash.

Darba šķidruma sagatavošana

Piepildīt smidzinātāja tvertni ar ūdeni līdz pusei, un ieslēgt maisītāju. Pievienojiet nepieciešamo Focus Ultra daudzumu, nogaidiet kamēr tas sajaucas ar smidzinātājā esošo ūdeni, piepildiet atlikušo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīt šķidrumu transporta un darba laikā. Pagatavotais darba šķidrums jāizmanto drīz pēc pagatavošanas.

Lietot tikai tīru ūdeni.

Smidzinātāja tīrīšana

Ievērojiet!

Pirms preparātu iepildīšanas tvertnē pārļiecinieties, ka tā ir pilnīgi tīra. Smidzinātāja tvertnēi pēc iepriekš izmantotā augu aizsardzības līdzekļa jābūt iztīrītai tā, kā tas paredzēts uz attiecīga augu aizsardzības līdzekļa marķējuma. Uz smidzinātāja tvertnes sienām palikuši pat ļoti nelieli sulfonilurīnvielas grupas herbicīdu (piem. Arrat, Granstar Premia, Grodyl u.c.) atlikumi, kopā ar Focus Ultra var radīt nopietnus kultūraugu bojājumus. Lai no tā izvairītos, ieteicams tvertni mazgāt ar piemērotu mazgāšanas līdzekli pirms un pēc Focus Ultra lietošanas.

Rezistences riski

Herbicīdu rezistences gadījumi produktiem, kas satur līdzīga iedarbības veida aktīvās vielas, kā Focus Ultra, it īpaši ACCāzes inhibitori (HRAC klase A) lauku pa laikam Eiropā tiek identificēti. Atkārtoti lietojot herbicīdus vienā un tajā pašā sezonā, vai vairākus gadus vienā laukā, jāizvēlas preparāti ar atšķirīgiem iedarbības mehānismiem. Pretējā gadījumā var izveidoties rezistenti nezāļu biotipi, kas var izplatīties un kļūt par dominējošām.

Vienmēr sekojiet HRAC vadlīnijām, lai izvairītos un ierobežotu rezistentu nezāļu izveidošanos un izplatīšanos.

Pēc iespējas vairāk jāizmanto agrotehniskie nezāļu ierobežošanas pasākumi (augseka, aršana u.c.)

Izmantojiet herbicīdu maisījumus vai herbicīdus ar dažādiem iedarbības veidiem kultūraugu sējumā, vai sekojošajām kultūrām.

Apsēkojiet laukus regulāri, un noskaidrojiet jebkuras neveiksmīgas nezāļu ierobežošanas cēloņus

Vides aizsardzības prasības

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot "Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā" ietverto likumu prasības un rekomendācijas. Preparāta izlišanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšana

Glabāt sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +30 °C. **Derīguma termiņš** glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Juridiskā atbildība

Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantē tā sastāvdaļu savstarpējo atbilstību un preparāta kvalitāti. Instrukcijas un ieteikumi ir pārbaudīti praksē daudzu gadu laikā. Preparāta iedarbību var ietekmēt dažādi faktori, kas raksturīgi katrai vietai vai reģionam, piemēram, laika apstākļi, augsnes īpašības, kultūraugu veidi, augu seka, lietošanas termiņi, preparāta devas, maisījumi ar citiem preparātiem, rezistentu organismu parādīšanās, smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti nelabvēlīgu apstākļu ietekmē ir iespējamas izmaiņas preparāta iedarbībā, vai arī kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām sekām, kā arī par zaudējumiem, kas var rasties ieteikto instrukciju patvaļīgas neievērošanas un ignorēšanas rezultātā preparāta ražotāji un izplatītāji nevar uzņemties atbildību.

® = BASF SE reģistrēta tirdzniecības zīme

Focus® Ultra

Taimekaitsevahend
HERBITSIID

Süsteemne herbitsiid ühe- ja mitmeaastaste kõrreliste umbrohutude tõrjeks järgmistel kultuuridel: uba, hernes (toiduks ja söödaks), lutsern seemneks, suhkrupeet, söödapeet ja söögipeet, kapsad (spargelkapsas, rooskapsas, lillkapsas, peakapsas, lehtkapsas, savoia kapsas), porgand, ristik seemneks, maasikas, punane aruhein seemneks; lina, mais (ainult tsüklotsüüdimile vastupidavad maisisordid), tali- ja suviraps, rüps, naeris, kaalikas, sibulad, porru, kartul, seemneviljalised viljapuud.

Toimeaine: tsüklotsüüdim 100 g/l (10,8 %)
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

Toodet võivad osta ja kasutada ainult professionaalsed kasutajad.
Sisaldab ohtlikke aineid: tsüklotsüüdim, lahustibensiin

Ettevatust

H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H315 Põhjustab nahaärritust.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H411 Mürine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohutamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P261 Vältida auru/pihustatud aine sissehingamist
P264 Pärast käitlemist pesta hooliga rohke vee ja seebiga.
P280 Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille/kaitsemaski.

P301 + P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P302 + P352 NAHALE SATTUMISEL: peske rohke seebi ja veega.

P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

Eemaldada kontaktlaadsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P331 Mitte kutsuda esile oksendamist.
P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P362+364 Võtta seljast saastunud riivad ja pesta enne korduskasutust.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SP1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažhide).

Registreerimisnumber: 0115/18.10.05
Tootjafirma: Tel: +49 180 2273 112
Hädaabi telefon: 112

Loa valdaja: BASF A/S,
Ved Stadsgraven 15, Postkast 4042,
DK 2300 Copenhagen

Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB,
Postkast 14, Laagri, Saue vald EE- 76491,
Harjumaa EE, Tel.: 372 530 30755

Tootja/pakkija
BASF SE
D-67056 Ludwigshafen, Saksamaa

Valmistaja: BASF A/S,
Ved Stadsgraven 15,
DK-2300 Køpenhagen S, Taani.
Tel.: 0045 32660700

Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise
kuupäevast alates.

Säilitamine: hoida temperatuuril
0 °C kuni + 30 °C.

Valmistamise kuupäev ja partii nr.:
vaata pakendil !

EST
Ettevatust



Herbicids
Herbicids ismüza un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša, cukurbešu, lopbarības biešu, kartupeļu, kāpostu, zemeņu, līnu, zirņu un burkānu sējumos un stādījumos.

Emulsijas koncentrāts
Darbīgā viela: cikloksidīms 100 g/l
Reģistrācijas Nr. 0065
Reģistrācijas klase 2.

Sastāvā esošās kaitīgās vielas: solventnāfta

Briesmas
H315 Kairina ādu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboni.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
P261d Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu.
P264 Pēc izmantošanas, ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm kārtīgi nomazgāt.
P280f Izmantot aizsargcimdus, acu aizsargus/sejas aizsargus.
P301 + P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANAS CENTRU vai ārstu.
P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.
P304 + P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt mierā stāvoklī, lai būtu ērti elpot.
P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACIM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes
Izņem kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P331 NEIZRAISĪT vemšanu.
P332 + P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.
P361 Neņem/Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.
P405 Glabāt slēgtā veidā.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
SP1 Nepiesārot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Emergency information telefon: +49 180 2273 112
Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis: 112
Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz aizsargiepakojuma Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0 °C līdz +30 °C.
Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Ražotājs: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vācija
Reģistrētājs: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Dānija
Pārstāvniecība: BASF Agro, Lamberto iela 33 B, Mārupe, tālr. 67 508 250

LV
Briesmas



81109825LV1086