



Corum® + Dash®

Herbitsiid



KASUTAMISE ABC




ÜKS PRITSIMINE

- BBCH 14–15:
Corum® + Dash®
1,0–1,25 l/ha + 1,0–1,25 l/ha



OLUKORRAS, KUS:

- enne ja pärast külvi on piisavalt niiskust;
- on väike kuni keskmine umbrohtumuse tase



JAOTATUD PRITSIMINE

- BBCH 12–13:
Corum® + Dash®
0,625 l/ha + 0,625 l/ha
- BBCH 14–15:
Corum® + Dash®
0,625 l/ha + 0,625 l/ha



OLUKORRAS, KUS:

- on pikaajaline põud, umbrohi tärkab pika ajavahemiku vältel;
- on suur umbrohtumus - eriti kõrviku, põld-konnatatra, punandi, valge hanemaltsa, roomava madaraga;
- on turbane muld (umbrohtunud, näiteks kõrvikutega);
- levivad suureseemnelised umbrohud, mis võivad hiljem sügavamalt tärgata.



KAKS PRITSIMIST

- Enne tärkamist:
Stomp® 1,5 l/ha
- BBCH 14–15:
Corum® + Dash®
1,0 l/ha + 1,0 l/ha



OLUKORRAS, KUS:

- suur umbrohtumus põldkannikese, mailaste, murunurmikate, põld-konnatatardega.



Kõige paremad tulemused saavutate siis, kui umbrohi on töötlemise ajal noor – 1–2 lehe staadiumis.


Kasutage taimekaitsevahendeid ohutusnõuete kohaselt. Enne kasutamist lugege alati etiketti ja teavet toote kohta.

BASF

We create chemistry

Corum®-i jaotatud pritsimine võimaldab põuastel aastatel saada suuremat saaki

Enamsaak t/ha



Dotnuva, 2020. aasta, põlduba 'Vertigo'

Corum® – pritsimisstrateegiat kohaldatakse olenevalt umbrohtude spektrist

Efektiivsus %

Umbrohu liik	Umbrohtude arv kontrollalal	Corum® 1,25 l/ha + Dash® 0,5 l/ha		Corum® 0,625 l/ha + Dash® 0,625 l/ha		Corum® 1,25 l/ha + Dash® 1,25 l/ha		Stomp® 1,5 l/ha enne tähtsust, Corum® 1,0 l/ha + Dash® 1,0 l/ha	
		BBCH 11-13		jaotatult 2 x: BBCH 11-13 ja BBCH 14-15		BBCH 14-15		BBCH 14-15	
Valge hanemalts	27,5	93		97,5		99		97,8	
Verev iminõges	17,5	72		97,8		98		98,5	
Põldmailane	16,8	65		88,5		92,3		99	
Põld-konnatatar	18,8	65		91,5		90		96,6	
Roomav madar	12,2	70,8		97,5		98		97	
Põldkannike	7	54		57		70		83,3	

Pritsitud liiga vara

Jaotatud pritsimine

Pritsitud õigel ajal

Kahe pritsimise strateegia (enne ja pärast tähtsust) **oli parim valik**

Dotnuva, 2019. aasta, hernes 'Respect', umbrohtude arvestus 28. juunil (28 päeva pärast viimast töötlemist)



PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMINE OPTIMAALSETES ILMASTIKUOLUDES!

Optimaalne temperatuur Corum®-i pritsimiseks – üle +5 °C öösel ja üle +10 °C päeval. See tagab umbrohu aktiivse kasvu ja herbitsiidi parema toime.

- Ärge pritsige, kui temperatuur on öösel alla +3 °C. Pärast öökülma oodake 2–3 päeva.
- Hommikupoolne pritsimine tagab parimad olud, et toimeained jõuaksid taimedesse.

BASF
We create chemistry