

Cleravo[®] Flex

Taimekaitsevahend
HERBITSIID

Süsteemse toimega mulla- ja leheherbitsiid kasutamiseks CLEARFIELD[®] talirapsi sortidel (CL), suvirapsi sortidel (CL) ja suvirüpsi sortidel (CL) umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks.

Toimeained: kvinmeraak 125 g/l (11,44 %)
imasamoks 12,5 g/l (1,14 %)
aminopüraliid 4,0 g/l (0,37 %)

Preparaadi vorm: vees lahustuv kontsentraat (SL)

Toode sisaldab ohtlikke aineid: kvinmeraak, imasamoks, aminopüraliid, bensüülalkohol. 23% segust koosneb komponentidest, mille äge nahakaudne ja sissehingamise mürgisus on teadmata.

Kasutuspiirangud: Mullaorganismide kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab toimeainet kvinmeraak rohkem kui üks kord kolme aasta jooksul. Põhjavee kaitsmiseks pidada kinni kultuurile, kulunormile ja kasutusajale vastavast kasutuspiirangust, mille leiab infolehel olevast tabelist või registrist toote kasutamise kirje alt. Mittesihtmärgtaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast ja külgnevatest kultuuridest või kasutada 75% triivi vähendavaid otsakuid.

Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Enne kasutamist lugege hoollega kaasasolevaid juhiseid.



ETTEVAATUST

H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P260 Udu/auru mitte sisse hingata.

P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille või kaitsemaski.

P301+P330+P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.

P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P303+P361+P353+P310 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätсед, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P405 Hoida luku taga.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Spe1 Mullaorganismide kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab toimeainet kvinmeraak rohkem kui üks kord kolme aasta jooksul.

SPe1 Põhjavee kaitsmiseks pidada kinni kultuurile, kulunormile ja kasutusajale vastavast kasutuspiirangust, mille leiab infolehel olevast tabelist või registrist toote kasutamise kirje alt.

Spe3 Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast ja külgnevatest kultuuridest või kasutada 75% triivi vähendavaid otsakuid.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Tootjafirma infotelefon: +49 180 2273112

Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber: 16662

Pakendid: 0,15; 0,25; 0,5; 1; 5; 10; 20 L

Eesti registreerimisnumber: 912/14.03.2025

Partii nr.: vaata pakendilt.

Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt.

Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast alates

Säilitamine: Hoida temperatuuril: 0 °C kuni + 40 °C.

Tootja/pakendaja: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Germany.

Loa valdaja: BASF UAB, Spaudos str. 6-1, LT-05132 Vilnius, Lithuania

Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, Tel.: 372 530 30755, e-post: agronoom@basf.com.

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT TOOTE ETIKETTI

ESMAABI

Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värske õhu kätte, kutsuge arst.

Kokkupuutel nahaga: Peske kohe 15 minuti jooksul rohke seebi ja voolava veega.

Kokkupuutel silmadega: Peske mõjutatud silma koheselt vähemalt 15 minutit voolava vee all, hoides silmalaugu lahti.

Neelamisel: Loputage kohe suud ning jooge klaas vett, pöörduge arsti poole.

Teave arstile: Viia läbi sümptomaatilist ravi (puhastamine, organismi funktsioonide tagamine); konkreetset vastumürki pole teada.

TOIMEVIIS

Cleravo Flex on süsteemne herbitsiid, mille umbrohi omastab lehtede ja juurte kaudu. Cleravo Flex on formuleeritud lahustuva kontsentraadina (SL) ja ei vaja lisaaineid ega määrgajaid.

Cleravo Flex on mõeldud kasutamiseks CLEARFIELD® rapsi ja rüpsi sortidel. Toode sisaldab 3 toimeainet: kvinmeraak, imasamoks ja aminopüraliid.

Kvinmeraak imendub juurte ja lehtede kaudu ja kandub laiali kogu taimes. Umbrohtudele mõjub juurte hävimise ja hormoontüüpi toime tagajärjel.

Imasamoks imendub juurte ja lehtede kaudu, seejärel liigub kogu taimes meristeem koesse. Imasamoksi toime on tugev laialehelistele umbrohtudele ja eriti tugev ristõielistele umbrohuliikidele. Tundlike taimede kasv on pärsitud varsti peale kasutamist.

Cleravo Flex on mõeldud kasutamiseks ainult CLEARFIELD® rapsi ja rüpsi sortidel (CL), mis on herbitsiidide rühma, mis hõlmab imasamoksi, suhtes vastupidavad.

Aminopüraliid imendub peamiselt roheliste lehtede kaudu, juurte kaudu omastamine on väiksema tähtsusega. Aminopüraliid liigub süsteemselt kogu taimes. Aminopüraliid mõjub ainult kaheidulehelistele taimedele. Pärast aminopüraliidi kasutamist umbrohtude lehed ja varred paksenevad, kõverduvad, varred väänduvad, mille tõttu tundlikel taimedel kasv peatub.

KASUTUSJUHEND

TOIME

Cleravo Flexi efektiivsus umbrohtudele sõltub pritsimise ajast. Umbrohud on herbitsiidi suhtes kõige tundlikumad, kui nad on väikesed ja aktiivses kasvufaasis, kuid tundlikke umbrohtusid saab ka hilisemates kasvufaasides edukalt tõrjuda. Herbitsiidi efektiivsus sõltub toote kulunormist, pritsimise ajast ja põllukultuurist.

CLEARFIELD® TALIRAPS

CLERAVO FLEX 1,8 l/ha umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks tärkamisest kuni 6. lehe kasvufaasini (BBCH 10-16) sügisel kasutamiseks.

Väga hea efektiivsus (100-95%): põldrõigas (*Raphanus raphanistrum*), linnurohu liigid (*Polygonum spp.*), põldsinep (*Sinapis arvensis/Brassica caber*), põld-litterhein (*Thlaspi arvense*), harilik hiirekõrv (*Capsella bursa-pastoris*), valge hanemalts (*Chenopodium album*), valge karikakar (*Anthemis arvensis*), vesihein (*Stellaria media*), valge sinep (*Sinapis alba*), harilik kurekael (*Erodium cicutarium*).

Hea efektiivsus (94,9-85%): rukkilill (*Centaurea cyanus*), kukemagun (*Papaver rhoeas*), kesalill (*Tripleurospermum inodorum*), harilik punand (*Fumaria officinalis*), teekummel (*Chamomilla recutita*), rukki-kastehein (*Apera spica-venti*), isekülvanud talioder, isekülvanud suvioder, roomav madar (*Galium aparine*), kurereha (*Geranium rotundifolium*), konnatatar (*Fallopia convolvulus*), põld-lõosilm (*Myosotis arvensis*), isekülvanud talinisu, verev iminõges (*Lamium purpureum*).

Keskmiselt hea efektiivsus (84,9-70%): madal kurereha (*Geranium pussilum*), pärsia mailane (*Veronica persica*), põldkannike (*Viola arvensis*).

Madal efektiivsus (69,9-50%): murunurmikas (*Poa annua*).

CLERAVO FLEX 1,4 l/ha umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks tärkamisest kuni 6. lehe kasvufaasini (BBCH 10-16) sügisel kasutamiseks.

Väga hea efektiivsus (100-95%): linnurohu liigid (*Polygonum spp.*), põldsinep (*Sinapis arvensis/Brassica caber*), harilik punand (*Fumaria officinalis*).

Hea efektiivsus (94,9-85%): põld-litterhein (*Thlaspi arvense*), rukkilill (*Centaurea cyanus*), harilik hiirekõrv (*Capsella bursa-pastoris*), kukemagun (*Papaver rhoeas*), valge hanemalts (*Chenopodium album*), vesihein (*Stellaria media*), valge sinep (*Sinapis alba*), kesalill (*Tripleurospermum inodorum*), teekummel (*Chamomilla recutita*), isekülvanud talioder, isekülvanud suvioder, roomav madar (*Galium aparine*), kurereha (*Geranium rotundifolium*), konnatatar (*Fallopia convolvulus*), isekülvanud talinisu.

Keskmiselt hea efektiivsus (84,9-70%): valge karikakar (*Anthemis arvensis*), rukki-kastehein (*Apera spica-venti*), põld-lõosilm (*Myosotis arvensis*), verev iminõges (*Lamium purpureum*), madal kurereha (*Geranium pusillum*), pärsia mailane (*Veronica persica*).

Madal efektiivsus (69,9-50%): põldkannike (*Viola arvensis*).

Cleravo Flex 2,0 l/ha umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks võrsumisfaasis kuni lehtede ja kasvukuhiku vahe on suurem kui 10 cm (BBCH 30-33) kevadel kasutamiseks.

Väga hea efektiivsus (100-95%): põld-litterhein (*Thlaspi arvense*).

Hea efektiivsus (94,9-85%): kukemagun (*Papaver rhoeas*), harilik hiirekõrv (*Capsella bursa-pastoris*), roomav madar (*Galium aparine*).

Keskmiselt hea efektiivsus (84,9-70%): rukkilill (*Centaurea cyanus*), harilik nisu (*Triticum aestivum*), teekummel (*Chamomilla recutita*), vesihein (*Stellaria media*), verev iminõges (*Lamium purpureum*), kesalill (*Tripleurospermum inodorum*).

Madal efektiivsus (69,9-50%): põldkannike (*Viola arvensis*).

CLEARFIELD® SUVIRAPS, SUVIRÜPS

Cleravo Flex 2,0 l/ha umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks tärkamisest kuni 6. lehe kasvufaasini (BBCH 10-16).

Väga hea efektiivsus (100-95%): põld-litterhein (*Thlaspi arvense*), põldsinep (*Sinapis arvensis/Brassica caber*), vesihein (*Stellaria media*), valge hanemalts (*Chenopodium album*), harilik punand (*Fumaria officinalis*), harilik hiirekõrv (*Capsella bursa-pastoris*).

Hea efektiivsus (94,9-85%): hõlmine iminõges (*Lamium amplexicaule*), kukemagun (*Papaver rhoeas*), kesalill (*Tripleurospermum inodorum*), roomav madar (*Galium aparine*), tähkjas kukehirss (*Echinochloa crus-galli*), konnatatar (*Fallopia convolvulus*), linnurohu liigid (*Polygonum spp.*), madal kurereha (*Geranium pusillum*), pärsia mailane (*Veronica persica*), rukkilill (*Centaurea cyanus*).

Keskmiselt hea efektiivsus (84,9-70%): kõrviku liigid (*Galeopsis spp.*), verev iminõges (*Lamium purpureum*).

Madal efektiivsus (69,9-50%): põldkannike (*Viola arvensis*).

Cleravo Flex 1,4 l/ha umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks tärkamisest kuni 6. lehe kasvufaasini (BBCH 10-16).

Väga hea efektiivsus (100-95%): põld-litterhein (*Thlaspi arvense*), põldsinep (*Sinapis arvensis/Brassica caber*), harilik punand (*Fumaria officinalis*).

Hea efektiivsus (94,9-85%): vesihein (*Stellaria media*), valge hanemalts (*Chenopodium album*), harilik hiirekõrv (*Capsella bursa-pastoris*), hõlmine iminõges (*Lamium amplexicaule*), kukemagun (*Papaver rhoeas*), konnatatar (*Fallopia convolvulus*).

Keskmiselt hea efektiivsus (84,9-70%): kesalill (*Tripleurospermum inodorum*), roomav madar (*Galium aparine*), tähkjas kukehirss (*Echinochloa crus-galli*), pärsia mailane (*Veronica persica*), rukkilill (*Centaurea cyanus*), kõrvikute liigid (*Galeopsis sp.*).

Madal efektiivsus (69,9-50%): linnurohu liigid (*Polygonum spp.*), madal kurereha (*Geranium pusillum*), verev iminõges (*Lamium purpureum*), põldkannike (*Viola arvensis*).

KASUTAMINE

Põllukultuur	Umbrohi	Kulunorm l/ha	Kasvufaas	Märkused
Taliraps	Kaheidulehelised umbrohud ja üheidulehelised umbrohud	1,4-1,8	Tärkamisest kuni 6. lehe kasvufaasini (BBCH 10-16)	Veekulu: 100–400 l/ha. Põhjavee kaitsmiseks mitte kasutada imasamoksi sisaldavat vahendit rohkem kui üks kord samal põllul kolme aasta jooksul. Põhjavee kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud aminopüraliidi sisaldavat vahendit rohkem kui üks kord samal põllul kahe aasta jooksul. Mullaorganismide kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab toimeainet kvinmeraak rohkem kui üks kord kolme aasta jooksul.
Taliraps	Kaheidulehelised umbrohud ja üheidulehelised umbrohud	2	Kevadel varsumisfaasis kuni lehtede ja kasvukuhiku vahe on suurem kui 10 cm (BBCH 30-33)	Veekulu: 100–400 l/ha. Mullaorganismide kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab toimeainet kvinmeraak rohkem kui üks kord kolme aasta jooksul.

Suviraps, suvirüps	Kaheidulehelised umbrohud ja üheidulehelised umbrohud	1,4-2	Tärkamisest kuni 6. lehe kasvufaasini (BBCH 10-16)	Veekulu: 100–400 l/ha. Põhjavee kaitsmiseks mitte kasutada imasamoksi sisaldavat vahendit rohkem kui üks kord samal põllul kolme aasta jooksul. Mullaorganismide kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab toimeainet kvinmeraak rohkem kui üks kord kolme aasta jooksul.
---------------------------	---	-------	--	--

Märkus: Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast ja külgnivatest kultuuridest või kasutada 75% triivi vähendavaid otsakuid.

Maksimaalselt on kultuuril lubatud 1 pritsimiskord.

Vihmakindlus: 1 tund pärast pritsimist.

Fütotoksilisus

Vältige ülekandumist e. triivi külgnivatele kultuuridele väljaspool pritsimise ala. Cleravo Flex võib äärmuslike ilmastikutingimuste korral põhjustada kultuurile fütotoksilisi tunnuseid, mis kaovad mõne nädala pärast ega avalda saagile negatiivset mõju.

Oma toodetud seeme (OTS)

Oma toodetud CLEARFIELD hübriidrapsi või -rüpsi seeme ei ole hübriid ja sellepärast sellest seemnest kasvatatud taimed: a) ei oma originaal emaliini hübriidi elujõudu; b) ei pruugi sisaldada kahte imasamoksi taluvust määravat geeni ning seetõttu ei talu täielikult CLEARFIELD® herbitsiidiga pritsimist.

Isekülvanud CLEARFIELD® rapsi ja rüpsi umbrohu tõrje

Mitte kasutada ühe toimeainega ALS inhibiitori herbitsiide (HRAC grupp 2) resistentsuse ohu tõttu kasutada isekülvanud CLEARFIELD rapsi ja rüpsi umbrohu tõrjeks. Kasutada tuleb teise toimeviisiga herbitsiidi, et umbrohtudel vähendada herbitsiidi resistentsuse väljaarenemise võimalust. Erineva toimemehhanismiga herbitsiidide kasutamine on tõestatud viis võidelda umbrohuresistentsuse probleemiga ja tõrjuda korraga laiemat hulka umbrohuliike. Lisainfot saab BASF esindajate poole pöördudes ning herbitsiidide klassifitseerimise kohta HRACi veebilehelt: <http://www.hracglobal.com/>

*HRAC (Herbicide Resistance Action committee).

JÄRGNEVAD KULTUURID

Pärast Cleravo Flexi kasutamist normaalses külvikorras tali- ja suvirapsi või rüpsi järel puuduvad piirangud järgmise kultuuri kasvatamiseks. Kui järgnevateks kultuurideks on lehtkõögiviljad, siis

enne istutamist on ooteaeg 30 päeva.

CLEARFIELD® taliraps

Kultuuri ikaldumisel sügisel, pärast sügisest Cletavo Flexiga pritsimist võib taliteravilju külvata, kui enne külvamist muld harida sügavalt ja intensiivselt (20 cm), ooteaeg vähemalt 1 kuu.

Juhul, kui taliraps on mingil põhjusel ikaldunud, siis järgmisel kevadel on võimalik külvata suvirapsi, kui enne külvamist muld harida 15 cm sügavuselt. Sügava ja intensiivse mullaharimise (20 cm) järel võib külvata suviteravilju ja maisi.

Kultuuri ikaldumisel, kui Cleravo Flexiga on samal kevadel pritsitud, võib suviteravilju, maisi ja CLEARFIELD® suvirapsi kasvatada pärast sügavat ja intensiivset mullaharimist (20 cm), enne külvamist ooteaeg 1 kuu. Cleravo Flexi kasutamisel jälgida toimeaine põhiseid kasutuspiiranguid.

CLEARFIELD® suviraps, suvirüps

Pärast Cleravo Flexi kasutamist normaalses külvikorras CLEARFIELD® suvirapsi ja suvirüpsi järel puuduvad piirangud järgmise kultuuri kasvatamiseks, enne külvamist on vajalik vähemalt 15 cm sügavune mullaharimine.

Kultuuri ikaldumisel ja kui Cleravo Flexiga on suviraps samal kevadel pritsitud, võib kasvatada ainult suviteravilju, maisi ja CLEARFIELD® suvirapsi (CL) sorte, enne külvamist muld harida sügavalt ja intensiivselt (20 cm), ooteaeg vähemalt 1 kuu. Cleravo Flexi kasutamisel jälgida toimeaine põhiseid kasutuspiiranguid.

RESISTENTSUS

Cleravo Flex sisaldab 3 toimeainet: kvinmerak, aminopüraliid ja imasamoks.

Kvinmerak kuulub herbitsiidide gruppi, mis toimib sünteetiliste auksiinidena (HRAC 4/29 rühm).

Aminopüraliid kuulub samuti sünteetiliste auksiinide gruppi (HRAC 4. rühm). Sellel herbitsiidide grupil on madal resistentsuse arenemise risk.

Imasamoks kuulub herbitsiidide gruppi, mis toimib ALS-inhibiitorina (HRAC 2. rühm). Selle grupi herbitsiide loetakse kõrge resistentsuse riskiga grupiks, sest on teada resistentsuse esinemine mitmel umbrohu liigil. Mõnedel üheaastastel kõrrelistel (nt. põld-rebasesaba, rukki-kastehein ja raihein) ja laialehelistel umbrohtudel (nt. kummel, kukemagun, vesihein) on välja arenenud resistentsed biotüübid 2-rühma herbitsiidide suhtes, mistõttu tõrje võib jääda nõrgaks. Riski vähendamiseks soovitatakse kasutada segusid või vahelduvalt erineva toimeviisidega tooteid, millel on hea mõju vastavatele umbrohuliikidele. Järgige alati HRAC-i juhiseid herbitsiidide suhtes resistentsete umbrohtude ennetamiseks ja nendest vabanemiseks. Jälgige pidevalt põllu seisukorda ja kui efektiivsus väheneb, püüdke välja selgitada põhjused, kuna see võib viidata resistentsuse tekkele.

Resistentsuse vältimise ja toimetuleku strateegia juhised on välja töötatud ja saadaval kohaliku CLEARFIELD rapsi herbitsiidide edasimüüja, turustaja või BASFi esindaja käest.

PRITSIMISLAHUSE VALMISTAMINE

Enne pritsimislahuse valmistamist tuleb veenduda, et prits, pihustid jm agregadi osad oleksid puhtad ja töökorras. LOKSUTA KANISTRIT HOOLEGA ENNE KASUTAMIST. ÄRA LISA Dash'i või teisi pindaktiivseid määrgajaid.

Enne avamist raputada preparaadi kanistrit korralikult. Täita pritsipaak 3/4 osas ettenähtud vee kogusega ja käivitada segisti. Lisada vajalik kogus Cleravo Flexi pritsipaaki, jätkates pidevalt segamist. Lisada ülejäänud vajaminev vee kogus. Hoida segisti töös nii transpordi kui ka pritsimise

ajal. Pritsimislahus tuleb kasutada kohe, ilma vaheaegasid tegemata. Tühjad kanistrid loputada vähemalt 3 korda puhta veega ja lisada saadud lahus pritsipaaki.

PRITSIMINE

Cleravo Flexi tuleb kasutada eeskirjade kohaselt kalibreeritud ja kontrollitud põllupritsis. Alati enne kasutamist prits puhastada ja veenduda selle korrasolekus ning järgida eelnevalt toodete kohta käivaid nõuandeid. Ärge kasutage taimekaitsevahendit, kui õhutemperatuur on üle +25 °C või tuule kiirus on suurem kui 4 m/s.

PRITSI PUHASTAMINE

Alati pese prits hoolikalt puhta veega kohe pärast pritsimistöö lõppu või kui vahetad preparaati.

1. Täitke pritsipaak 1/3 veega. Loputa pritsipaak lülitades sisse ringlussüsteem. Pritsi loputusvesi eelnevalt töödeldud põllule. Korda kolm korda. Loputamisel peaks puhta vee paak sisaldama puhast vett, mis vastab 10% täispaagi mahule. Pritsipaagi võib täielikult tühjendada hajutatult töödeldud põllule.
2. Puhasta traktor ja pritsi välisküljed, eelistatavalt põllul.
3. Järgi pritsimisseadme puhastusvahendi juhiseid. Veendu, et vesi ja puhastusvahend oleksid loputatud läbi kõigi pritsimisseadme osade.
4. Pihustid ja filtrid tuleb eemaldada ja puhastada puhastusvahendiga eraldi.

SEGATAVUS

Clevaro Flex sobib paagisegudesse teiste pestitsiididega. Küsimuste korral pöörduda toote ametliku esindaja poole.

OHUTUSABINÕUD

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed

Kaitsta laste eest. Mitte hoida koos toidu, ravimite ja loomasöödaga. Ärge jooge, sööge ega suitsetage ainega töötamise ajal. Vältige preparaadi sattumist nahale, riietele või silmadele. Preparaadiga töötamisel tuleb kasutada isikukaitsevahendeid.

Hingamisteede kaitse: Sobiv hingamiselundite kaitsevahend kõrgemate kontsentratsioonide või pikaajalise mõju vastu: keskmise efektiivsusega kombineeritud filter orgaaniliste gaaside/aurude, anorgaaniliste, anorgaaniliste, anorgaaniliste hapete ja leeliseliste ühendite osakeste püüdmiseks (nt EN 14387 tüüp ABEK).

Kätekaitse: Sobivad kemikaalikindlad kaitsekindad (EN 374) ka pikaajalise kokkupuute puhuks (soovitav: kaitseindeks 6, mis EN 374 järgi vastab läbitungimisele >480 minutit): näiteks nitrilikummi (0,4 mm), kloropreenikummi (0,5 mm), butüülkümmi (0,7 mm) ja muud.

Silmakaitse: Tihedalt istuvad turvaprillid (pritsmepillid) (nt. EN 166).

Kehakaitse: Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, nt. põll, kaitsesaapad, keemiakaitse-ülikond (vastavalt EN 14605 pritsmete korral või EN ISO 13982 tolmu korral).

Peale tööd võtta tööriided seljast ning pesta käed ja nägu seebi ja veega.

HOIUSTAMINE

Hoida ainult originaalpakendis, koos etiketiga, tihedalt suletuna, ohutus, jahedas, kuivas ja lukustatud kohas. Hoida otsese päikese kiirguse ja soojust eest, vältida preparaadi külmumist. Säilitada suletuna ning lastele kättesaamatus kohas. Hoida eraldi eraldi toidust, ravimitest ja

loomasöödast. Hoiukoha täpsemad nõuded on välja toodud Põllumajandusministri 29.11.2011 määruses nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“. Hoida temperatuuril 0 °C kuni + 40 °C. Kinnises originaalpakendis säilib toode 24 kuud.

TÜHJA PAKENDI KAHJUTUSTAMINE:

Taara tühjendamisel ei tohi preparaat keskkonda sattuda. Pärast tühjendamist loputa taarat kasutades integreeritud surveloputuse seadet või loputada käsitsi vähemalt kolm korda puhta veega. Lisada loputusvesi valmistatavasse töölahusesse. Loputatud ja tühjad pakendid koguda kokku ning tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele. Taara korduvkasutamine on keelatud. Kemikaalijäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

TOOTJA VASTUTUS

Meie tooted vastavad täielikult kvaliteedinõuetele. Nende koostis on garanteeritud. Tootja ei vastuta mõjudest tekkiva kahjustuse eest, mille on põhjustanud toote ebaõige säilitamine ja/või kasutamine.

® - BASF registreeritud kaubamärk